

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（モモ）

2026/7/8現在の登録内容

| RAC | 対象 | 薬剤名        | 希釈倍率<br>及び使用量 | 使用時期                 | 使用方法 | 本剤の<br>使用回数 | 備考                                                  | その他登録のある害虫                                                                        |
|-----|----|------------|---------------|----------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1B  | 成虫 | スミチオン乳剤    | 1000倍         | 成虫発生初期<br>但し、収穫3日前まで | 散布   | 6回以内        | MEP:6回以内<br>(但し、樹幹処理は1回以内)                          | アブラムシ類、クワシロカイガラムシ、カメムシ類、ハマキムシ類、モモハモグリガ、クワコナカイガラムシ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、ナシヒメシンクイ（心折防止） |
| 3A  | 成虫 | アグロスリン水和剤  | 1000倍         | 収穫前日まで               | 散布   | 5回以内        | シバ・ルトリン：5回以内                                        | アブラムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ、アカエグリバ、オオエグリバ、ヒメエグリバ、アケビコノハ、シンクイムシ類                          |
| 4A  | 成虫 | アクタラ顆粒水溶剤  | 2000倍         | 収穫前日まで               | 散布   | 3回以内        | アクトラン：3回以内                                          | アブラムシ類、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、モモハモグリガ、シンクイムシ類                                          |
|     | 成虫 | ダントツ水溶剤    | 2000倍         | 収穫7日前まで              | 散布   | 3回以内        | ダントツ：3回以内                                           | アブラムシ類、カメムシ類、コガネムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類                                               |
|     | 成虫 | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍         | 収穫前日まで               | 散布   | 3回以内        | アクトラン：3回以内                                          | アブラムシ類、カイガラムシ類、カメムシ類、コガネムシ類成虫、コスカシバ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、モモチョッキリゾウムシ            |
| 14  | 成虫 | パダンSG水溶剤   | 1500倍         | 収穫14日前まで             | 散布   | 3回以内        | パダン：3回以内                                            | アブラムシ類                                                                            |
| 21A | 成虫 | ハチハチフロアブル  | 1000～2000倍    | 成虫発生期<br>但し、収穫前日まで   | 散布   | 2回以内        | ハチハチ：2回以内                                           | アブラムシ類、モモサビダニ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類                                              |
| 22B | 成虫 | アクセルフロアブル  | 1000倍         | 収穫前日まで               | 散布   | 2回以内        | アクセル：4回以内<br>(但し、樹幹散布は2回以内、散布は2回以内)<br>作目名は「もも類」で登録 | コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類                                                                 |
| 28  | 成虫 | テッパン液剤     | 2000倍         | 収穫前日まで               | 散布   | 2回以内        | テッパン：2回以内                                           | カメムシ類、コガネムシ類、コスカシバ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類                                         |

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（スモモ）

2026/7/8現在の登録内容

| RAC | 対象 | 薬剤名        | 希釈倍率<br>及び使用量 | 使用時期     | 使用方法 | 本剤の<br>使用回数 | 備考                                       | その他登録のある害虫                         |
|-----|----|------------|---------------|----------|------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 3A  | 成虫 | アグロスリン水和剤  | 1000倍         | 収穫前日まで   | 散布   | 2回以内        | シハルトリツ：2回以内                              | カメムシ類、シンクイムシ類                      |
| 4A  | 成虫 | アクタラ顆粒水溶剤  | 2000倍         | 収穫7日前まで  | 散布   | 2回以内        | アブラムシ：2回以内<br>「小粒核果類」で登録                 | アブラムシ類                             |
|     | 成虫 | ダントツ水溶剤    | 2000倍         | 収穫3日前まで  | 散布   | 3回以内        | アブラムシ：3回以内                               | アブラムシ類、カメムシ類                       |
|     | 成虫 | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍         | 収穫前日まで   | 散布   | 3回以内        | アブラムシ：3回以内                               | アブラムシ類、カイガラムシ類、ス<br>モモミハバチ、シンクイムシ類 |
| 14  | 成虫 | パダンSG水溶剤   | 1500倍         | 収穫14日前まで | 散布   | 3回以内        | アブラムシ：3回以内                               | アブラムシ類                             |
| 22B | 成虫 | アクセルフロアブル  | 1000倍         | 収穫前日まで   | 散布   | 2回以内        | アブラムシ：4回以内<br>(但し、樹幹散布は2回以内、散<br>布は2回以内) | コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ<br>類              |
| 28  | 成虫 | テッパン液剤     | 2000倍         | 収穫前日まで   | 散布   | 2回以内        | アブラムシ：2回以内<br>「小粒核果類」で登録                 | ハマキムシ類、モモヒメヨコバイ、<br>シンクイムシ類、ケムシ類   |

## クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（ネクタリン）

2026/7/8現在の登録内容

| RAC | 対象 | 薬剤名       | 希釈倍率<br>及び使用量 | 使用時期             | 使用方法 | 本剤の<br>使用回数 | 備考                                                     | その他登録のある害虫                               |
|-----|----|-----------|---------------|------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3A  | 成虫 | アグロスリン水和剤 | 1000倍         | 収穫前日まで           | 散布   | 2回以内        | シハルメトリン：2回以内                                           | アブラムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類             |
| 4A  | 成虫 | アクタラ顆粒水溶剤 | 2000倍         | 収穫前日まで           | 散布   | 3回以内        | アクトキチム：3回以内                                            | アブラムシ類、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、モモハモグリガ、シンクイムシ類 |
| 14  | 成虫 | パダンSG水溶剤  | 1500倍         | 収穫14日前まで         | 散布   | 3回以内        | カルタップ：3回以内                                             | アブラムシ類                                   |
| 21A | 成虫 | ハチハチフロアブル | 1000～2000倍    | 成虫発生期（但し、収穫前日まで） | 散布   | 2回以内        | トルフェンビラト：2回以内                                          | アブラムシ類、モモサビダニ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類     |
| 22B | 成虫 | アクセルフロアブル | 1000倍         | 収穫前日まで           | 散布   | 2回以内        | メタフルミゾン：4回以内<br>（但し、樹幹散布は2回以内、散布は2回以内）<br>作目名は「もも類」で登録 | コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類                        |

## クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（オウトウ）

2026/7/8現在の登録内容

| RAC | 対象 | 薬剤名        | 希釈倍率<br>及び使用量 | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の<br>使用回数 | 備考            | その他登録のある害虫                                    |
|-----|----|------------|---------------|---------|------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 3A  | 成虫 | アグロスリン水和剤  | 1000倍         | 収穫3日前まで | 散布   | 2回以内        | シバノメトリソ：2回以内  | カメムシ類、ショウジョウバエ<br>類、オウトウハマダラミバエ               |
| 4A  | 成虫 | アクタラ顆粒水溶剤  | 2000倍         | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内        | アセタキサム：2回以内   | カメムシ類、オウトウショウ<br>ジョウバエ                        |
|     | 成虫 | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍         | 収穫前日まで  | 散布   | 1回          | アセタミプリド：1回    | カイガラムシ類、カメムシ類、<br>アザミウマ類、オウトウショウ<br>ジョウバエ     |
| 28  | 成虫 | テッパン液剤     | 2000倍         | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内        | シクラニプロール：2回以内 | カメムシ類、マメコガネ、コス<br>カシバ、ハマキムシ類、オウト<br>ウショウジョウバエ |

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（ウメ）

2026/7/8現在の登録内容

| RAC | 対象 | 薬剤名        | 使用時期  | 使用方法                  | 本剤の使用回数 | 備考   | その他登録のある害虫                  | 希釈倍率<br>及び使用量                   |
|-----|----|------------|-------|-----------------------|---------|------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1B  | 成虫 | スミチオン乳剤    | 1000倍 | 成虫発生初期<br>但し、収穫14日前まで | 散布      | 2回以内 | MEP:2回以内                    | アブラムシ類、ハマキムシ類、アメリカシロヒトリ         |
| 3A  | 成虫 | アグロスリン水和剤  | 2000倍 | 収穫7日前まで               | 散布      | 3回以内 | シハルメトリン：3回以内                | アブラムシ類、モモヒメヨコバイ                 |
| 4A  | 成虫 | アクタラ顆粒水溶剤  | 2000倍 | 収穫7日前まで               | 散布      | 2回以内 | チアマトキサム：2回以内                | アブラムシ類、カメムシ類                    |
|     | 成虫 | ダントツ水溶剤    | 2000倍 | 収穫前日まで                | 散布      | 3回以内 | クロチアジソン：3回以内                | アブラムシ類、カメムシ類、ケシキスイ類、ケムシ類        |
|     | 成虫 | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 | 収穫前日まで                | 散布      | 3回以内 | アセタミプリド：3回以内                | アブラムシ類、カイガラムシ類、ケシキスイ類、ノコメトガリキリガ |
| 22B | 成虫 | アクセルフロアブル  | 1000倍 | 収穫前日まで                | 散布      | 3回以内 | メタフルミゾン：3回以内                | ケシキスイ類、ケムシ類                     |
| 28  | 成虫 | テッパン液剤     | 2000倍 | 収穫前日まで                | 散布      | 2回以内 | シラニリプロール：2回以内<br>「小粒核果類」で登録 | ハマキムシ類、モモヒメヨコバイ、シンクイムシ類、ケムシ類    |