

セイタカアワダチソウが咲き始めました。 腐蛆病予防の季節です。

蜜蜂用動物用医薬品を適切に使用して、
病気を予防しましょう。

現在日本で蜜蜂に使用できる動物用医薬品は
次のとおりです。



疾病名	原因	主成分	使用期間	休薬期間	使用禁止期間
アメリカ腐蛆病	細菌	ミロサマイシン	7日間	投与終了後14日間	食用に供するはちみつ及びその他の生産物の生産前14日
バロア病	ダニ	フルバリネート	6週間以内		食用に供するはちみつ及びその他の生産物を生産している期間
		アミトラズ	6週間		採蜜期間中及びローヤルゼリーの採取期間

注意！ 抗菌性物質がはちみつから検出された場合、
商品回収・廃棄等の損害は、全額生産者の負担となる場合があります！
定められた用量・方法で投与しましょう。

医薬品を使用したら、使用記録をつけて保管しましょう。

①使用年月日②使用場所③対象動物④薬品名⑤用法・用量⑥出荷可能日

<腐蛆病予防に有効な消毒について>

対象: 巣箱や器具

①火炎消毒: トーチランプなどのバーナーで焼く

②消毒薬による消毒:

・グルタルアルデヒド : 1%溶液に20分間浸漬or噴霧

・次亜塩素酸ナトリウム: 0.5%溶液に30分間浸漬(金属部材は腐食)

注意 ☆消毒薬は蜜蝋などの汚れ(有機物)をおとしてから使用してください。
☆逆性石鹼(パコマ等)、二硫化炭素は無効です。

《平成25年度腐蛆病発生状況》

発生日	発生場所	発生戸数	発生群数
9/5	北杜市明野町	1戸	2群
10/4	北杜市明野町	1戸	1群
	合計	2戸	3群

衛生管理に注意して病気の発生を防ぐとともに、日常の観察をこまめに行い病気の早期発見に努めましょう!

お気軽に
ご相談ください!



西部家畜保健衛生所

TEL:0551-22-0771

FAX:0551-22-6728