

ふ そ

## 腐蛆病を防ぎましょう！



腐蛆病予防薬の投与時期になりました。蜜蜂用動物用医薬品を使用する際は、**適切な使用**により病気の予防に努めましょう。また、巣箱・器具等は消毒を行い、衛生的にみつばちを飼養しましょう。

## ◎現在日本で蜜蜂に使用できる動物用医薬品

対象疾病	主成分 (薬品名)	使用 期間	休薬 期間	使用禁止期間
<b>アメリカ 腐蛆病</b>	ミロサマイシン (みつばち用アピテン)	7日間	投与 終了後 14日間	食用に供する はちみつ等の 生産前14日
バロア病	フルバリネート (日農アピスタン)	6週間 以内	なし	食用に供する はちみつ等を 生産している 期間
バロア病	アミトラズ (アピバール)	6週間	なし	採蜜期間中及 びローヤルゼ リーの採取期 間

## ◎動物用医薬品を使用する際の注意

動物用医薬品等がはちみつから検出された場合、商品回収・廃棄等の損害は、**生産者の負担**となる場合があります。定められた用量・方法で投与しましょう。

また、医薬品を使用したら、使用記録をつけて保管しましょう。

## 【項目】

- ①使用年月日 ②使用場所 ③対象動物 ④薬品名 ⑤用法・用量  
⑥出荷可能日



## ◎腐蛆病予防に有効な消毒方法

火炎消毒

水洗後、乾燥し、ガスバーナー等で火炎

消毒液

- ・ グルタルアルデヒド1%溶液に20分浸す
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム0.5%溶液に30分浸す

**注意** ☆消毒は蜜蝋などの汚れ(有機物)を落としてから行ってください。  
☆逆性石鹼（パコマ等）はアメリカ腐蛆病には無効です。

## ◎平成26年度腐蛆病発生状況

発生日	発生場所	発生疾病	発生戸数	発生群数
5/28	北杜市明野町	ヨーロッパ腐蛆病	1戸	1群
9/24	北杜市須玉町	アメリカ腐蛆病	1戸	8群
10/31	北杜市須玉町	アメリカ腐蛆病	1戸	4群
		合計	3戸	13群

## ◎腐蛆病で死亡した幼虫

- ・ アメリカ腐蛆病



← 幼虫は溶解して糸を引く（アメリカ農務省から引用）

- ・ ヨーロッパ腐蛆病



← 幼虫は灰褐色になり水っぽい（家畜疾病カラーアトラスから引用）

山梨県西部家畜保健衛生所

電話 0551-22-0771 FAX 0551-22-6728

夜間・土日・休日 090-5568-0817 または 090-5564-1018