


# 冬越し前に 蜂群の衛生管理を徹底しましょう



セイタカアワダチソウが咲き始め、秋の訪れを感じる季節となりました。冬越しの準備を始めている方も多いと思います。今一度、衛生管理の徹底をお願いします。

## ①疾病対策

腐蛆病、ダニに対する予防対策として、投薬法があります。現在日本でミツバチに対して承認されている動物用医薬品は次のとおりです。医薬品を使用する場合は、適切に使用して病気を予防しましょう。

疾病名	原因	主成分	使用期間	使用禁止期間
アメリカ腐蛆病	細菌	ミロサマイシン	7日間	投与中・投与後14日間は、食用のハチミツ等を採取することができない。
バロア病	ダニ	フルバリネート	6週間以内	食用のハチミツ等を採取している期間は使用できない。
		アミトラズ		

## ★動物用医薬品を使用する際の注意★

ハチミツは直接人の口に入る食品です。ハチミツ中に動物用医薬品が含まれないよう使用説明書を確認し、使用禁止期間、使用上の注意を守ってご使用下さい。また、医薬品を使用したら使用記録の帳簿をつけて保管しましょう。

【帳簿の記載項目一覧】

- ①使用年月日 ②使用場所 ③医薬品の名称 ④対象群数・管理番号  
⑤用法・用量 ⑥出荷可能年月日



## ②衛生管理

アメリカ腐蛆病の原因菌 (*Paenibacillus larvae*) は、芽胞を形成する細菌です。通常の細菌に比べ、熱・乾燥・消毒薬に対する強い抵抗性を示すため、以下の方法により消毒を行います。

- ①火炎消毒: ガスバーナー等で焼く
- ②消毒薬による消毒: ・グルタルアルデヒド  
・次亜塩素酸ナトリウム

### ★消毒を実施する際の注意★

- ・消毒薬は、蜜蝋等の汚れ(有機物)を取り除いてから使用してください。
- ・消毒薬は、各商品の使用方法に則って使用して下さい。
- ・消毒後は、水洗を十分に行ってください。

## 《平成28年度腐蛆病発生状況》

- ・現在までに管内での腐蛆病の発生はありません。
- ・今後も衛生管理に注意して病気の発生を防ぐとともに、日常の観察をこまめに行い病気の早期発見に努めましょう。



※ミツバチに異変等があれば、当所まで御連絡ください。

山梨県西部家畜保健衛生所

韮崎市本町3丁目5-24

TEL:0551-22-0771

FAX:0551-22-6728