

## 鹿児島県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内32例目)

### 【概要】

- ・鹿児島県出水市 採卵鶏 約22万羽
- ・簡易検査および遺伝子検査で陽性。  
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

### 【令和4年12月9日現在の発生状況】

- ・家きん：18道県32事例（うち、関東は2県2事例）
- ・野鳥：14道県98事例（うち、関東は1県1事例）
- ・飼養鳥：2県2事例

### ＜交差汚染防止の重要性＞

- ・私服・靴（通勤着）から場内着・場内用長靴へ更衣する際、同じ場所で更衣すると、更衣前の汚れが鶏舎着へ伝播（**交差汚染**）し、鶏舎内へ持込まれることとなります。
- ・交差汚染の防止には、必ずしも新たな施設や高額な建物が必要ではなく、既存の施設のままだも**いろいろ工夫**することにより、目的を達成することができます。
- ・長靴を交換する場所にスノコを利用し、スノコの手前で履いて来た長靴を脱ぎ、スノコに乗ってから鶏舎用長靴に履き替えるだけでも鶏舎（農場）外の汚れを鶏舎内に持込むのを**大幅に低減**できます。

- ① **敷地内や鶏舎の周りの消毒**の実施
- ② 農場に入る際の専用衣服と長靴への交換、鶏舎に入る際の専用長靴への交換とともに、交換の前後で使用する長靴等が**変わらない**ようにする
- ③ 手指の消毒の上、長靴を消毒するときは**汚れをしっかりと落としてから**実施  
などをおこたらないよう**行動を徹底！**

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

# 農場周辺の**高病原性鳥インフルエンザ**のウイルスが **非常に多くなっています！**

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。

**これまで以上に、本病の発生予防を徹底しましょう！**

**家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが  
特に重要です！**

## 発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の**消毒は毎日**行いましょう！
- 家きん舎等への出入り時に**消毒の実施・長靴の交換**が適切にできているか、**動線が交差していないか**、今一度、**点検・確認**をお願いします！
- **長靴はしっかり汚れを落としてから消毒**し、踏込消毒槽などの**消毒薬**は少なくとも**毎日**、汚れたらその都度、**交換**しましょう！
- 農場内や家きん舎の周囲には**ウイルスが侵入する経路が多く存在**していますので、今一度、**点検・確認**をお願いします！



◆ 飼養家さんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→

