

広島県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内58例目)

【概要】

- ・広島県三次市 採卵鶏 約83.5万羽
- ・簡易検査および遺伝子検査で陽性。
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

＜交差汚染防止の重要性＞

- ・私服・靴(通勤着)から場内着・場内用長靴へ更衣する際、同じ場所で更衣すると、更衣前の汚れが鶏舎着へ伝播(**交差汚染**)し、鶏舎内へ持込まれることとなります。
- ・交差汚染の防止には、必ずしも新たな施設や高額な建物が必要ではなく、既存の施設のままでも**いろいろ工夫**することにより、目的を達成することができます。
- ・長靴を交換する場所にスノコを利用し、スノコの手前で履いて来た長靴を脱ぎ、スノコに乗ってから鶏舎用長靴に履き替えるだけでも鶏舎(農場)外の汚れを鶏舎内に持込むのを**大幅に低減**できます。

本病発生防止のため、各自、飼養衛生管理基準の内容を再点検し、

- 1.衛生管理区域に立ち入る者の**手指消毒**等(項目13)
- 2.衛生管理区域専用の**衣服及び靴の設置**並びに**使用**(項目14)
- 3.衛生管理区域に立ち入る**車両の消毒**等(項目15)
- 4.家きん舎に立ち入る者の**手指消毒**等(項目20)
- 5.家きん舎ごとの専用の**靴の設置**及び**使用**(項目21)
- 6.野生動物の侵入防止のための**ネット等の設置**、点検及び**修繕**(項目24)
- 7.ねずみ及び害虫の**駆除**(項目26)

上記7項目について徹底を心がけ、

不遵守の場合には**大至急改善**してください。

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018