

Warning

岐阜県で高病原性鳥インフルエンザ の疑似患畜を確認！（家きん9例目）

大流行したR4シーズンに匹敵するペースで、発生が続いています
農場における防疫対策の再徹底をお願いします！

【概要】岐阜県本巣市採卵鶏 約1.5万羽

- ・11月18日 農場より通報、簡易検査で陽性。
- ・11月19日 遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

【野鳥における事例（疑い含む）も全国に拡大】 **既に31例で確認!**

- ・11月11日:鹿児島県(環境材料) 11月13日:福島県
- ・11月16日以降も疑い事例が継続して発生

▶ 人、物、車両の入出時対策

- ・衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
- ・着用の前後で交差のない動線、および明確な境界を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

▶ 野生動物の侵入防止、誘引防止

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
- ・たい肥舎への防鳥ネット設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止
- ・隠れ場所を作らない(整理整頓・草刈り)



<高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・神経症状、下痢等
- ・出血、壊死
- ・産卵低下または停止
- ・高い死亡率



鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト: <http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018