宮崎県で高病原性鳥インフルエンザ の疑似患畜を確認!(家きん12例目)

全国どこで発生してもおかしくない状況です 農場における防疫対策の再徹底をお願いします!

【概要】宮崎県川南町 肉用鶏飼養農場 約3.5万羽

- ・12月2日 農場より通報、簡易検査で陽性。
- •12月3日 遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザ の疑似患畜と確認。

【野鳥における事例も全国に拡大・継続】

・陽性確認:1道12県54例+疑い事例:9例

〈北海道·福島·新潟·秋田·滋賀·徳島·鹿児島·福岡·岩手·福井·鳥取・熊本・愛知〉

▶人、物、車両の入出時対策

- 衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
- 着用の前後で交差のない動線、および 明確な境界を確保
- 適切な車両消毒、手指消毒の実施
- 家きん舎ごとの専用の靴の使用
- •侵入防止対策を出入りする関係者へ周 知徹底

▶野生動物の侵入防止、誘引防止

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕 →特にカラス、イタチ等の侵入防止を!
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
- たい肥舎への防鳥ネット設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切 な処理など誘引を防止
- ・隠れ場所を作らない(整理整頓・草刈り)

<高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- 顔面の腫れ、むくみ
- •神経症状、下痢等

- ·出血、壊死
- ・産卵低下または停止
- ・高い死亡率



鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト: http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018