

Warning

# 愛知県で高病原性鳥インフルエンザを 連続して確認！（家きん22～24例目）

農場の「隙」を埋めるよう、今一度  
**防疫対策の再点検・鶏舎周囲の消毒**を  
お願いします！

【農場の概要】

- ・1月 9日 愛知県常滑市 採卵鶏飼養農場 約12.9万羽
- ・1月10日 愛知県常滑市 採卵鶏飼養農場 約 5.7万羽
- ・1月10日 愛知県常滑市 採卵鶏飼養農場 約12.0万羽

【野鳥における事例も全国に拡大・継続】

・陽性確認：1道15県94例＋疑い事例：5例

北海道・福島・新潟・秋田・滋賀・徳島・鹿児島・福岡・岩手・福井・鳥取・熊本・愛知・埼玉・千葉・高知

▶ **人、物、車両の入出時対策**

- ・衛生管理区域**専用**の衣服や靴の使用
- ・着用の前で**交差のない動線**、および**明確な境界**を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・**家きん舎ごとの専用**の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

▶ **野生動物の侵入防止、誘引防止**

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の**破損修繕**  
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に**覆い**を設置
- ・**たい肥舎への防鳥ネット**設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など**誘引を防止**
- ・隠れ場所を作らない(整理整頓・草刈り)



< **高病原性鳥インフルエンザの症状** >

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・神経症状、下痢等
- ・出血、壊死
- ・産卵低下または停止
- ・**高い死亡率**



鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで  
電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728  
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018