

Warning

岡山県で 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認！（家きん8例目）

西日本で
続発！

～年末の忙しい時期でも農場内の不備を見逃さないで！～
**自己点検の実施と毎月の報告、
不備があれば早急な対応をお願いします！**

【概要】農場から通報、簡易検査及び遺伝子検査で陽性

・12月20日 岡山県津山市 採卵鶏飼養農場 約 43 万羽

【野鳥における事例も増加】

・陽性確認：1道9県58例（野鳥49例、環境試料9例）

北海道・宮崎県・山形県・鹿児島県・新潟県・福岡県・群馬県・福島県・大分県・高知県で陽性事例確認

飼養衛生管理の基本的な管理項目を**毎月点検・改善しましょう！**

▶人、物、車両の入出時対策

- ・衛生管理区域**専用**の衣服や靴の使用
- ・着用の前後で**交差のない動線**、および**明確な境界**を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・**家きん舎ごと**の**専用**の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

▶野生動物の侵入防止、誘引防止

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の**破損修繕**
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に**覆い**を設置
- ・**たい肥舎**への**防鳥ネット**設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など**誘引を防止**
- ・隠れ場所を作らない（整理整頓・草刈り）

自己
防衛

<高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色になる
- ・出血、壊死
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・産卵低下または停止
- ・神経症状、下痢等
- ・高い死亡率

少しでも異常を感じたら早期通報をお願いします！

発見
通報

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018


令和7年シーズンの発生状況

これまでに8事例約240万羽が殺処分の対象に

● 家きん
★ 野鳥・環境試料

※ 疑似患者確認時の羽数

	地域	疑似患者 判定日	用途	羽数（約）	亜種
1	北海道白老町	10/22	採卵鶏	45.9 万羽	H5N1
2	北海道恵庭市	11/2	採卵鶏	23.6 万羽	H5N1
3	新潟県胎内市	11/4	採卵鶏	63 万羽	H5N1
4	新潟県胎内市	11/9	採卵鶏	28 万羽	H5N1
5	宮崎県日向市	11/22	肉用鶏	4.8 万羽	H5N1
6	鳥取県米子市	12/2	肉用鶏	7.5 万羽	H5N1
7	兵庫県姫路市	12/16	採卵鶏	24 万羽	H5N1
8	岡山県津山市	12/20	採卵鶏	43 万羽	H5N1



予防対策の重要ポイント

