

別紙 訂正内容

OP156のファインセーブフロアブルについて、ねぎのシロイチモジヨトウには登録がありません。

P156 訂正前

ねぎ害虫防除基準掲載農薬一覧

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用害虫名			
					ネギアザミウマ	ハモグリバエ類	クロバネキノコバエ類	シロイチモジヨトウ
フォース粒剤	3A	テフルトリン	1	1			○	
===== 中略 =====								
ファインセーブフロアブル	UN	フロメトキン	2	2	○※b	○※a		○


※1 は種時土壌混和は1回以内、植付時土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回以内
 ※2 定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内
 ※3 定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内 ※4 定植時までの処理は1回以内
 ※5 灌注は1回以内、散布は3回以内 ※6 定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内
 ※a ネギハモグリバエ適用 ※b アザミウマ類適用

P156 訂正後

ねぎ害虫防除基準掲載農薬一覧

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用害虫名			
					ネギアザミウマ	ハモグリバエ類	クロバネキノコバエ類	シロイチモジヨトウ
フォース粒剤	3A	テフルトリン	1	1			○	
===== 中略 =====								
ファインセーブフロアブル	UN	フロメトキン	2	2	○※b	○※a		

※1 は種時土壌混和は1回以内、植付時土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回以内
 ※2 定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内
 ※3 定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内 ※4 定植時までの処理は1回以内
 ※5 灌注は1回以内、散布は3回以内 ※6 定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内
 ※a ネギハモグリバエ適用 ※b アザミウマ類適用



なお、山梨県農薬適正使用サポートシステムでの検索結果では、正しい登録内容が表示されます。