

薬生薬審発 0817 第 1 号  
令和 3 年 8 月 17 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長  
( 公 印 省 略 )

### 医薬品の一般的名称について

標記については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて（平成 18 年 3 月 31 日薬食発第 0331001 号厚生労働省医薬食品局長通知）」等により取り扱っているところです。今般、我が国における医薬品の一般的名称（以下「JAN」という。）について、新たに別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。

（参照）

「日本医薬品一般的名称データベース」<https://jpdb.nihs.go.jp/jan/Default.aspx>  
( 別添の情報のうち、JAN 以外の最新の情報は、当該データベースの情報で対応することとしています。 )

(別表2) INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表2)

登録番号 302-5-B2

JAN(日本名) : ロペグインターフェロン アルファー2b(遺伝子組換え)


JAN(英名) : Roperginterferon Alfa-2b (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

PCDLPQTHSL GSRTTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK  
 AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNNDLEACV  
 IQGVGVVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR  
 SFSLSTNLQE SLRSKE

P1 : PEG化部位

ポリエチレングリコールの結合様式



C<sub>865</sub>H<sub>1356</sub>N<sub>230</sub>O<sub>256</sub>S<sub>9</sub> (タンパク質部分)


ロペグインターフェロン アルファー2bは、インターフェロン アルファー2b(遺伝子組換え)類縁体であり、N末端にProが付加され、2本のメトキシポリエチレングリコール鎖(分子量: 約43,000)がリンカーを介して結合している(PEG結合部位: Pro1残基)。ロペグインターフェロン アルファー2bは、166個のアミノ酸残基からなるPEG化タンパク質(分子量: 約61,000)である。

Roperginterferon Alfa-2b is Interferon Alfa-2b (Genetical Recombination) analog in which Pro is attached to N-terminus, to which two methoxy polyethylene glycol polymers (molecular weight: ca. 43,000) are bound via a linker (pegylation site: Pro1 residue). Roperginterferon Alfa-2b is a pegylated protein (molecular weight: ca. 61,000) consisting of 166 amino acid residues.

登録番号 302-5-B3

JAN (日本名) : デルシメラゴン リン酸

JAN (英 名) : Dersimelagon Phosphoric Acid



1-{2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-シクロペニチル-3-フルオロ-4-(4-メトキシフェニル)ピロリジン-3-カルボニル]-4-(メトキシメチル)ピロリジン-3-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル}ピペリジン-4-カルボン酸 一リン酸

1-{2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-Cyclopentyl-3-fluoro-4-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carbonyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl}piperidine-4-carboxylic acid monophosphoric acid

登録番号 302-5-B4

JAN (日本名) : ロザノリキシズマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Rozanolixizumab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖

DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKSSQSLV GASGKTYLYW LFQKPGKAPK  
RLIYLVSTLD SGIPSRFSGS GSGTEFTLTI SSLQPEDFAT YYCLQGTHFP  
HTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK  
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE  
VTHQGLSSPV TKSFnRGEC


H鎖

EVPLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFTFS NYGMVWVRQA PGKGLEWVAY  
IDSDGDNTYY RDSVKGRFTI SRDNAKSSLY LQMNSLRAED TAVYYCTTGI  
VRPFLYWGQG TLTVVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF  
PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVP SSLGTKYTC  
NVDHKPSNTK VDKRVESKYG PPCPPCPAPE FLGGPSVFLF PPKPKDTLM  
SRTPEVTCVV VDVSQEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTYRVV  
SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPSSIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP  
SQEEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS  
FFLYSRLTVK KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK

H鎖N294 : 糖鎖結合 ; H鎖K444 : 部分的プロセシング

L鎖C219 – H鎖C131, H鎖C223 – H鎖C223, H鎖C226 – H鎖C226 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造



C<sub>6462</sub>H<sub>9984</sub>N<sub>1704</sub>O<sub>2016</sub>S<sub>44</sub> (タンパク質部分, 4本鎖)

H鎖 C<sub>2174</sub>H<sub>3350</sub>N<sub>572</sub>O<sub>670</sub>S<sub>16</sub>

L鎖 C<sub>1057</sub>H<sub>1646</sub>N<sub>280</sub>O<sub>338</sub>S<sub>6</sub>

ロザノリキシズマブは、遺伝子組換えヒト化及びキメラ抗ヒト新生児型Fc受容体（FcRn）モノクローナル抗体であり、H鎖はラット抗FcRn抗体の相補性決定部、ヒトフレームワーク部及びヒトIgG4の定常部からなり、L鎖はラット抗FcRn抗体の可変部及びヒトIgGの定常部からなる。H鎖の225番目のアミノ酸残基はProに置換されている。ロザノリキシズマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により産生される。ロザノリキシズマブは、444 個のアミノ酸残基からなるH鎖（ $\gamma$ 4鎖）2本及び219個のアミノ酸残基からなるL鎖（ $\kappa$ 鎖）2本で構成される糖タンパク質（分子量：約148,000）である。

Rozanolixizumab is a recombinant humanized and chimeric anti-human neonatal Fc receptor (FcRn) monoclonal antibody in which the H-chains are composed of complementarity-determining regions derived from rat anti-FcRn monoclonal antibody, human framework regions and a human IgG4 constant regions and the L-chains are composed of variable regions derived from rat anti-FcRn antibody and human IgG constant regions. The amino acid residue at position 225 in the H-chain is substituted by Pro. Rozanolixizumab is produced in Chinese hamster ovary cells. Rozanolixizumab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 148,000) composed of 2 H-chains ( $\gamma$ 4-chains) consisting of 444 amino acid residues each and 2 L-chains ( $\kappa$ -chains) consisting of 219 amino acid residues each.

登録番号 302-5-B5

JAN (日本名) : フェラジリマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Feladilimab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖

EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCSASSSVS YMHWYQQKPG QAPRLLIYDT  
SKLASGIPAR FSGSGSGTDY TLTISSEPE DFAVYYCFQG SGYPYTFGQG  
TKLEIKRTVA APSVFIFPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD  
NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSLTTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL  
SSPVTKSFNR GEC


H鎖

QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYAMHWVRQA PGQGLEWMGL  
ISIYSDHTNY NQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCGRNN  
YGNYGWYFDV WGQGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV  
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK  
TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFEGGPS VFLFPPKPKD  
TLMISRTPEV TCVVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST  
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY  
TLPPSQEEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQOPEN NYKTTPPVLD  
SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK

H鎖 Q1 : 部分的ピログルタミン酸 ; H鎖 N298 : 糖鎖結合 ; H鎖 K448 : 部分的プロセシング

L鎖 C213-H鎖 C135, H鎖 C227-H鎖 C227, H鎖 C230-H鎖 C230 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造



C<sub>6450</sub>H<sub>9888</sub>N<sub>1696</sub>O<sub>2036</sub>S<sub>46</sub> (タンパク質部分, 4本鎖)

H鎖 C<sub>2199</sub>H<sub>3368</sub>N<sub>580</sub>O<sub>685</sub>S<sub>17</sub>

L鎖 C<sub>1026</sub>H<sub>1580</sub>N<sub>268</sub>O<sub>333</sub>S<sub>6</sub>


フェラジリマブは、遺伝子組換え抗ヒト誘導性T細胞共刺激因子 (ICOS) モノクローナル抗体であり、その相補性決定部はマウス抗体に由来し、その他はヒト IgG4 に由来する。H鎖の 229 及び 236 番目のアミノ酸残基はそれぞれ Pro 及び Glu に置換されている。フェラジリマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により產生される。フェラジリマブは、448 個のアミノ酸残基からなる H鎖 ( $\gamma 4$ 鎖) 2 本及び 213 個のアミノ酸残基からなる L鎖 ( $\kappa$ 鎖) 2 本で構成される糖タンパク質 (分子量: 約 148,000) である。

Feladilimab is a recombinant anti-human inducible T-cell costimulator (ICOS) monoclonal antibody, the complementarity-determining regions of which are derived from mouse antibody and other regions are derived from human IgG4. In the H-chain, the amino acid residues at positions 229 and 236 are substituted by Pro and Glu, respectively. Feladilimab is produced in Chinese hamster ovary cells. Feladilimab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 148,000) composed of 2 H-chains ( $\gamma 4$ -chains) consisting of 448 amino acid residues each and 2 L-chains ( $\kappa$ -chains) consisting of 213 amino acid residues each.

登録番号 302-5-B6

JAN (日本名) : アコラミジス塩酸塩

JAN (英 名) : Acoramidis Hydrochloride



C<sub>15</sub>H<sub>17</sub>FN<sub>2</sub>O<sub>3</sub> • HCl

3-[3-(3,5-ジメチル-1*H*-ピラゾール-4-イル)プロポキシ]-4-フルオロ安息香酸 一塩酸塩

3-[3-(3,5-Dimethyl-1*H*-pyrazol-4-yl)propoxy]-4-fluorobenzoic acid monohydrochloride

登録番号 302-5-B7

JAN (日本名) : レカネマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Lecanemab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖

DVVMTQSPLS	LPVTPGAPAS	ISCRSSSQSIV	HSNGNTYLEW	YLQKPGQSPK
LLIYKVSNRF	SGVPDRFSGS	GSGTDFTLRI	SRVEAEDVGI	YYCFQGSHVP
PTFGPGTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVVCL	LNNFYPREAK
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSTYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC			

H鎖


EVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCSASGFTFS	SFGMHWVRQA	PGKGLEWVAY
ISSGSSTIYY	GDTVKGRFTI	SRDNAKNSLF	LQMSSLRAED	TAVYYCAREG
GYYYGRSYYT	MDYWGQGTTV	TVSSASTKGP	SVFPLAPSSK	STSGGTAALG
CLVKDYFPEP	VTWSWNSGAL	TSGVHTFPBV	LQSSGLYSLS	SVVTVPSSSL
GTQTYICNVN	HKPSNTKVDK	RVEPKSCDKT	HTCPPCPAPE	LLGGPSVFLF
PPPKDITLMI	SRTPEVTCVV	VDVSHEDEPEV	KFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE
EQYNSTYRVV	SVLTVLHQDW	LNGKEYKCKV	SNKALPAPIE	KTISKAKGQP
REPQVYTLPP	SREEMTKNQV	SLTCLVKGFY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT
TPPVLDSDGS	FFLYSKLTVD	KSRWQQGNVF	SCSVMHEALH	NHYTQKSLSL

SPGK

H鎖 N304 : 糖鎖結合 ; H鎖 K454 : 部分的プロセシング

L鎖 C219-H鎖 C227, H鎖 C233-H鎖 C233, H鎖 C236-H鎖 C236 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造



$\text{C}_{6544}\text{H}_{10088}\text{N}_{1744}\text{O}_{2032}\text{S}_{46}$  (タンパク質部分, 4本鎖)

H鎖  $\text{C}_{2216}\text{H}_{3407}\text{N}_{587}\text{O}_{681}\text{S}_{17}$

L鎖  $\text{C}_{1056}\text{H}_{1641}\text{N}_{285}\text{O}_{335}\text{S}_6$



レカネマブは、遺伝子組換え抗ヒトアミロイドベータペプチドモノクローナル抗体であり、その相補性決定部はマウス抗体に由来し、その他はヒトIgG1に由来する。レカネマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により産生される。レカネマブは、454個のアミノ酸残基からなるH鎖（ $\gamma$ 1鎖）2本及び219個のアミノ酸残基からなるL鎖（ $\kappa$ 鎖）2本で構成される糖タンパク質（分子量：約150,000）である。

Lecanemab is a recombinant anti-human amyloid beta peptide monoclonal antibody, the complementarity-determining regions of which are derived from mouse antibody and other regions are derived from human IgG1. Lecanemab is produced in Chinese hamster ovary cells. Lecanemab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 150,000) composed of 2 H-chains ( $\gamma$ 1-chains) consisting of 454 amino acid residues each and 2 L-chains ( $\kappa$ -chains) consisting of 219 amino acid residues each.

登録番号 302-5-B9

JAN (日本名) : デュークラバシチニブ

JAN (英 名) : Deucravacitinib



6-(シクロプロパンカルボキシアミド)-4-[2-メトキシ-3-(1-メチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-イル)アニリノ]-*N*-(<sup>2</sup>H<sub>3</sub>)メチルピリダジン-3-カルボキシアミド

6-(Cyclopropanecarboxamido)-4-[2-methoxy-3-(1-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl)anilino]-*N*(<sup>2</sup>H<sub>3</sub>)methylpyridazine-3-carboxamide

登録番号 302-6-B3

JAN (日本名) : サバトリマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Sabatolimab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖

AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASESVE YYGTSLMQWY QQKPGKAPKL  
LIYAASNVES GVPSRFSGSG SGTDFTLTIS SLQPEDFATY FCQQSRKDPS  
TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV  
QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV  
THQGLSSPVT KSFNRGEC


H鎖

QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT SYNMHWRQA PGQGLEWMGD  
IYPNGNDTSY NQKFKGRVTI TADKSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCARVG  
GAFFPMWDYWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCRSRSTSEST AALGCLVKDY  
FPEPVTVWSN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGKTYT  
CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPPKDTLM  
ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTAKPR EEQFNSTYRV  
VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLF  
PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQOPENNYK TPPVLDSDG  
SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLG

H鎖 Q1 : 部分的ピログルタミン酸 ; H鎖 N295 : 糖鎖結合

L鎖 C218 – H鎖 C132, H鎖 C224 – H鎖 C224, H鎖 C227 – H鎖 C227 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造



C<sub>6398</sub>H<sub>9886</sub>N<sub>1698</sub>O<sub>2032</sub>S<sub>48</sub> (タンパク質部分, 4本鎖)

H鎖 C<sub>2162</sub>H<sub>3330</sub>N<sub>570</sub>O<sub>674</sub>S<sub>18</sub>

L鎖 C<sub>1037</sub>H<sub>1617</sub>N<sub>279</sub>O<sub>342</sub>S<sub>6</sub>

サバトリマブは、遺伝子組換え抗ヒトT細胞免疫グロブリンムチンファミリーメンバー3 (TIM-3) モノクローナル抗体であり、その相補性決定部はマウス抗体に由来し、その他はヒト IgG4 に由来する。H鎖の226番目のアミノ酸残基はProに置換されており、C末端のLysは除去されている。サバトリマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により產生される。サバトリマブは、444個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ4鎖)2本及び218個のアミノ酸残基からなるL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タンパク質(分子量:約149,000)である。

Sabatolimab is a recombinant anti-human T-cell immunoglobulin mucin family member 3 (TIM-3) monoclonal antibody, the complementarity-determining regions of which are derived from mouse antibody and other regions are derived from human IgG4. In the H-chain, the amino acid residue at position 226 is substituted by Pro, and Lys at the C-terminus is deleted. Sabatolimab is produced in Chinese hamster ovary cells. Sabatolimab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 149,000) composed of 2 H-chains (γ4-chains) consisting of 444 amino acid residues each and 2 L-chains (κ-chains) consisting of 218 amino acid residues each.

※ JAN以外の情報は、参考として掲載しました。